





Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDiuendres 25 03 2022



Nhèu ventada



Problèma de nhèu ventada en còtes nautes.

Damb eth vent moderat deth quadrant sud-èst, ath long des darrèri dies, apròp des crestes, en canaus e conques s'an format plaques de vent delicades. Agustes son principalement petites mès en quauqui casi se pòden desencadenar damb facilitat. Peth dessus des 2300 m aproximativament e enes vals que tèrmien damb era Ribagorçana e era Palharsa, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perilh ei mès gran. Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles purgues de nhèu umida de mida petita en totes es còtes. Ath delà, son possibles beri lauegi d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies repòsen ath dessus d'ua crosta en totes es orientacions. Agustas nhèu s'estacarà lentament damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères fòrça arribentes e pòc freqüentades e en còtes nautes.

Enes pales soleienques: Eth mantèth de nhèu vielh ei umit en generau. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atendirà ath long deth dia. Enes pales ombrères e en còtes baishes e mejanes: Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e non s'atendirà pas.

Tendència

Eth perilh de lauegi de nhèu seca e umida demorarà invariable.



Grad de perih 1 - Fèble

**Tendència: perih de lauegi constant**

enDiuendres 25 03 2022 →



Nhèu umida



2300m

En totes es còtes era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla.

Dempús d'ua net serena, ath maitin predominen condicions de lauegi favorables. Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perih de lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida aumentarà leugèrament. Es lauegi umits pòden a viatges desencadenar-se ath pas d'ua persona, mès majoritariament arribar a dimensions petites. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales extrèmament arribentes orientades a sud-èst, sud e oèst per dejós des 2400 m aproximativament e tanben en terren dret e escarpat.

Celh de nhèu

Enes pales soleienques e tanben en còtes baixes: Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà tà formar ua crosta portanta e s'atendirà ath long deth dia.

Enes pales ombrères per dessús des 2000 m aproximativament: Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà tà formar ua crosta portanta e non s'atendirà pas.

Per dessús des 2000 m aproximativament son presenti de 100 a 200 cm de nhèu. En còtes nautes e nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendéncia

Es condicions demoren primaueraus. Eth perih de lauegi de nhèu umida serà superior ja de bon maitin.