


Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDimecres 04 01 2023



Lliscaments



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **small**



Plaques de vent



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **small**

Encara possibles de manera aïllada allaus de lliscament basal i purgues de neu humida. Neu ventada recent en altitud.

Als vessants herbosos extremadament inclinats, en qualsevol moment són possibles noves allaus de lliscament basal, que de manera aïllada poden arribar ser mitjaneres. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal. A més en el transcurs de la jornada són possibles algunes purgues de neu humida de mida petita. Aquestes poden ser desencadenades al pas d'una persona o de manera natural.

Als vessants obacs: El mantell de neu vell és estable de manera generalitzada. Fins al matí, amb la neu recent i el vent del sud-oest amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent majoritàriament primes sobretot prop dels cims. Aquestes són de manera aïllada només de mida petita però en alguns casos fàcils de desencadenar.

Atenció al perill de ser arrossegats per una allau sobre penya-segats. A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de relliscar i caure als vessants inclinats.

Mantell de neu

Fins al matí caurà una mica de neu sobretot al sud i a l'est. En les properes hores el vent serà, prop dels cims, de moderat a fort. El vent del sud-oest transportarà poca neu només. Als vessants obacs i a cotes altes: El mantell de neu consisteix en cristalls facetats, amb una crosta a la superfície.

Als vessants assolellats: La superfície del mantell de neu es regelarà per formar una crosta portant i s'estovarà al llarg del dia.

Per sobre del límit del bosc són presents de 25 a 40 cm de neu, localment més. En cotes altes i a l'alta muntanya els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. En cotes baixes pràcticament no hi ha neu.

Tendència

Dimecres: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, lleuger augment del perill d'allaus de lliscament basal i purgues de neu humida. Ràpid afebliment del perill d'allaus de neu seca.