




Grad de perilh 2 - Moderat



Atencion as purgues e lauegi de nhèu umida. Encara possibles de manèra isolada lauegi de placa seca.

Damb era umidificacion, en tot moment son possibles nauï purgues e lauegi de nhèu umida, mès majoritariament petiti. Aguestes pòden desencadenar-se ath pas d'ua persona o naturaument. Enes pales ombrères fòrça arribentes era probabilitat de desencadenament ei major.

Es acumulacions de nhèu ventada dures pòden en quauqui casi encara èster desencadenades accidentaument en pales fòrça arribentes e pòc freqüentades orientades ath nòrd per dessús des 2000 m aproximativament, especialment enes sòns marges. Aguestes repòsen ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha sustot en pales ombrères emparades deth vent. Es lauegi son de manèra fòrça isolada de mida mejana. En particular en limit sud d'Aran, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perilh ei leugèrament mès gran.

Celh de nhèu

Es acumulacions de nhèu ventada dures repòsen ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha en pales ombrères. Es perfius stratigrafics e es tèsti d'estabilitat indiquen era estabilitat prauba deth mantèth de nhèu en particular enes zònes ombrères emparades deth vent.

Damb era umidificacion, an queigut quauqu'uns purgues e lauegi de nhèu umida de mida petita. Enquiara net era ploja barrejada damb nhèu causarà enes pales ombrères en còtes baishes e mejanes ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

En còtes mejanes e nautes son presenti de 40 a 100 cm de nhèu, locaument encara mès. En nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendència

Dijaus: Damb era nheuada, progressiu augment deth perilh de lauegi de nhèu seca. Damb eth heiredament, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida.