


## Grad de perilh 2 - Moderat



Lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida a compdar deth maitin. Problèma de nhèu ventada vielha en còtes nautes.

Damb era umidificacion, en tot moment son possibles nauï lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau, tanben de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben enes pales soleienques per dessus des 2000 m aproximativament e tanben enes pales ombrères per dejós des 2500 m aproximativament. Es acumulacions de nhèu ventada vielhes pòden de manèra isolada encara èster desencadenades espciaument enes sòns marges sustot en pales fòrça arribentes e pòc freqüentades orientades ath nòrd e en altitud. Aguestes son de manèra fòrça isolada de mida mejana.

Es excursions de montanha an de finalizar tà meddia.

### Celh de nhèu

Es acumulacions de nhèu ventada vielhes repòsen ath dessus des coches trendes sustot en pales ombrères emparades deth vent en altitud. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Eth heiredament nocturn serà reducit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e s'atrendirà rapidament.

Per dessus des 2000 m aproximativament son presenti de 70 a 120 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes nautes es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

### Tendéncia

Eth dimars queirà ploja enquia en còtes nautes. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau augmentarà ja ath long dera maitiada.