




Grad de perillh 3 - Mercat



Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perillh.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau sustot en pales ombrères e en còtes nautes e nauta montanha. Es lauegi son a viatges de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben esepciaument apròp des crestes per dessús des 2200 m aproximativament e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Aguesti endrets son cubèrti damb nhèu recenta e donques de mau reconéisher.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi sequi e umits aumentarà temporaument sustot enes pales soleienques fòrça arribentes per dessús des 1600 m aproximativament. Es lauegi en aguesti sectors son de manèra isolada de mida mejana e soent de bon desencadenar.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion detalhada der itinerari.

Celh de nhèu


A compdar de dissabte an queigut de 30 a 40 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent deth sud a transportat intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Principalement enes zònes ombrères e emparades deth vent, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles trends.

Per dessús des 1800 m aproximativament son presenti de 70 a 110 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes nautes e nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendéncia

Dimars: A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, adicionau augment deth perillh de lauegi de nhèu umida.

Grad de perill 3 - Mercat



Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada. En cors dera jornada es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument.

Es plaques de vent se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes. Es lauegi son en generau de mida petita. Es endrets perilhosi se tròben espciaument apròp des crestes per dessús des 2200 m aproximativament. Aguesti son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconéisher.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son probables lauegi de nhèu seca e umida, mès majoritariament petiti.

Ei importanta ua eleccion prudenta der itinerari.

Celh de nhèu

A compdar de dissabte an queigut de 10 a 20 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument mès. Eth vent deth sud a transportat intensament era nhèu recenta. Principaument enes zònes emparades deth vent, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles.

Per dessús des 2000 m aproximativament son presenti de 40 a 80 cm de nhèu, locaument encara mès. Enes pales soleienques e tanben en còtes baixes non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Dimars: A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, adicionau augment deth perill de lauegi de nhèu umida.