



## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
en dijous, 20 de Heruèr de 2025



Capa feble  
persistente



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **petita**

### Problèma de coches febles persistentes en còtes nautes.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes pòden, de manèra isolada, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire per dessús des 2300 m aproximativament. Enes pales ombrères fòrça arribentes, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra isolada e especialment amb subrecargues fòrtes. Es lauegi pòden de manèra isolada arténher mida mejana. Es endrets perillosi se tròben ena entrada de conques e canaus e tanben apròp de còths e crestes. Naues acumulacions de nhèu ventada s'an format en particular ath sud e ath sud-oèst e en altitud.

Enes pales soleienques arribentes, son possibles purgues e lauegi de nhèu umida de mida petita en totes es còtes.

### Mantell de neu

Era superfície deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia. A compdar de meddia eth solei e era calor causaràn enes pales soleienques arribentes ua umidificacion deth mantèth de nhèu.

En quauqui endrets diuèrses coches de nhèu ventada arrepòsen ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha. Eth ligam entre es plaques de vent e amb era nhèu vielha ei locaument desfavorable.

Per dessús deth limit deth bòsc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Especialment enes pales soleienques en còtes baishes e mejanas i a pòca nhèu. En toti es sectors i a mens nhèu dera acostumada.

### Tendència

Leugèr afebliment deth perilh de lauegi.