



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: perill d'allaus en augment
en dimèrcles, 23 d'Abriu de 2025



Placa de vent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



1900m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

Atencion a era nhèu ventada e era nhèu umida. Especiaument enes vals que tèrmien damb era Ribagorçana e era Palharsa, es endrets perilhosi son mès freqüenti.

Damb era nhèu recenta e eth vent deth quadrant sud, en particular apròp de còths e crestes e tanben en altitud s'an format plaques de vent. Aguestes se tròben sustot enes pales orientades ath nòrd-oèst, nòrd e èst. Es lauegi son soent de mida mejana e pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire.

En limit damb era Ribagòrça e eth Palhars, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perilh ei leugèrament mès gran. Encara non se descarten pas lauegi de mida grana.

Damb era pujada dera temperatura diürna, especiaument enes pales soleienques arribentes e en còtes baixes e mejanes lèu non son probables naui purgues e lauegi de nhèu umida de mida petita e mejana. Ath delà, son possibles lauegi d'esguitlament basau.

Es excursions de montanha requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Mantell de neu

En ua zòna grana eth temps serà fòrça embromat A compdar de meddia queirà un shinhau de nhèu. Eth vent serà, apròp des crestes, de feble a moderat.

Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e s'atrendirà ja ath long deth maitin. En còtes baixes non i a nhèu.

Tendència

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, clar augment deth perilh de lauegi de nhèu umida. Progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca.