



Grau de Perill 2 - Moderat



Era nhèu ventada e era nhèu umida requerissen atencion. Especiaument enes vals que tèrmien damb era Ribagorçana e era Palharesa, es endrets perilhosi son mès freqüenti.

Damb era pujada dera temperatura diürna, en totes es orientacions son probables purgues e lauegi de nhèu umida aumens de mida petita. Es lauegi pòden arrossegar tot eth mantèth de nhèu saturat d'aigua e arténher mides mejanes.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes pòden, en quauqui casi, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes en nauta montanha. En limit damb era Ribagòrça e eth Palhars, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perilh ei leugèrament mès gran. Es lauegi en aguesti sectors son de manèra isolada de mida mejana.

Actuaument, eth servici de prediccion de lauegi a informacion limitada deth mantèth de nhèu. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perilh de lauegi locau.

Mantell de neu

Eth temps serà fòrça soleienc Eth vent serà, apròp des crestes, de moderat a fòrt.

Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atendirà ath long deth dia. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. En còtes baishes non i a nhèu.

Tendència

Diuendres: A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, clar augment deth perilh de lauegi de nhèu umida. Enes pales damb plaques de vent: Progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca.