





Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
en dimars, 30 de Deseme de 2025



Placa de vent



2200m



Neu humida



2200m

Estabilitat del mantell de
neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

Estabilitat del mantell de neu:

pobre

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble
persistent

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion. Possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida ath long deth dia.

Era nhèu recenta e plaques de vent en conjunt an d'èster avalorades damb prudència especiaument en pales ombrères fòrça arribentes. Aguesta nhèu capère un mantèth feble de nhèu vieha sustot en pales ombrères damb pòca nhèu. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada son a viatges grossudes e en quauqui casi favorables ath desencadenament. Aguestes an demorat en part nheuades e, per aquerò, de mau identificar. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth sud-èst, enquiath dimenge, sustot enes pales orientadi a nòrd e oèst s'an format plaques de vent adicionaus. Aguestes darrères se placen en particular ath pè de parets rocassoses e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi sequi son a viatges de mida mejana.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles nau lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, mès majoritariament petiti.

En particular enes limits sud e èst d'Aran, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perilh ei mès gran. Es excursions damb esquís e raquetes de nhèu, e tanben es baishades dehòra de pistes requerissen experiència ena avaloracion deth perilh de lauegi e cautela.

Mantell de neu

Enes darrèri dies an queigit de 30 a 40 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Enes pales arribentes soleienques: Damb es temperatures doces e era radiacion solara, eth mantèth de nhèu s'a fixat. Enes pales ombrères en côtes mejanes e nautes: Era nhèu recenta e es plaques de vent non s'an estacat ben damb era nhèu vieha. Es desencadenaments de lauegi e es observacions sus eth



terren confirmen aquesta situacion. Enes pales emparades deth vent ombrères: De cap ara superfície, era nhèu s'a facetat, damb gibra de superfície.

Dimenge: Enes limits sud e èst d'Aran Eth vent deth sud-èst a transportat era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha.

En còtes mejanes son presenti de 50 a 100 cm de nhèu, locaument encara mès. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendència

Dimars: Damb eth vent moderat deth quadrant nòrd-èst , se formaràn plaques de vent addicionaus. Eth perilh de lauegi de nhèu seca augmentarà leugèrament ath long deth dia. Eth perilh de lauegi de nhèu umida disminuirà progressivament.