




Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant →
en dimars, 17 de Març de 2026



Placa de vent



^
Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble
persistent



^
2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

Nhèu ventada e nhèu umida son era hònt principau de perill.

Es plaques de vent inestables des darrèri dies se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau en totes es orientacions e generaument per dessús deth limit deth bòsc. Precaucion sustot ath pè de parets rocassoses e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi son soent de mida mejana. Aguestes pòden, de manèra fòrça isolada, implicar era nhèu vielha e, arténher mides fòrça granes sustot enes pales ombrères emparades deth vent.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar deth maitin son probables cada viatge mès nombrosi purgues e lauegi de nhèu umida, tanben de mida mejana.

Es excursions damb esquís e raquetes de nhèu, e tanben es baishades dehòra de pistes requerissen experiéncia ena avaloracion deth perill de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Mantell de neu

Enes darrèri dus dies an queigut de 20 a 30 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument mès. Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat intensament era nhèu recenta.

Es plaques de vent repòsen ath dessús de coches febles esepciaument en pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament.

Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn sustot enes pales soleienques arribentes ua rapida umidificacion deth mantèth de nhèu.

En còtes mejanes son presenti de 150 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès. Es celhs de nhèu càmbien fòrça en còtes nautes e nauta montanha pera influéncia deth vent.



Tendència

Dimars: A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perilh de lauegi de nhèu umida.