




Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant →
en dimèrcles, 18 de Març de 2026



Placa de vent



2000m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



1500m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **mitjana**

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar de manera critica. Purgues e lauegi de nhèu umida en cors dera jornada.

Es plaques de vent a viatges grossudes des darrèri dies se pòden desencadenar de manera accidentau en totes es orientacions en còtes mejanes e nautes, especialment enes sòns marges. Precaucion sustot enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi son soent de mida mejana. Aguestes pòden, encara, implicar era nhèu vielha e, arténher mides fòrça granes sustot enes pales ombrères emparades deth vent.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son probables cada viatge mès nombrosi purgues e lauegi de nhèu umida, tanben de mida mejana.

Es excursions damb esquís e raquetes de nhèu, e tanben es baishades dehòra de pistes requerissen experiéncia ena avaloracion deth perill de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Mantell de neu

Enes darrèri dies an queigut de 20 a 30 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mès. Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha.

Es plaques de vent ben visibles demoren encara inestables en totes es orientacions. Aguestes repòsen ath dessus d'ua crosta sustot en pales soleienques. Enes pales emparades deth vent ombrères: Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes. Es desencadenaments de lauegi e es observacions sus eth terren mòstren era estabilitat praubá deth mantèth de nhèu.

Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn sustot enes pales soleienques arribentes ua rapida umidificacion deth mantèth de nhèu.



En còtes mejanes son presenti de 150 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès. Es celhs de nhèu càmbien fòrça en còtes nautes e nauta montanha pera influéncia deth vent.

Tendència

Dimèrcles: Eth perilh de lauegi de nhèu seca e umida non disminuirà pas encara.