





Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant
en dimars, 24 de Març de 2026



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Placa de vent



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **petita**



Neu recent



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **petita**

Era nhèu recenta, era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.

Era pòca nhèu recenta e en particular plaques de vent en generau petites formades pendent era nheuada se pòden desencadenar damb facilitat de manera naturau o accidentau en totes es orientacions en còtes mejanes e nautes. Principalement enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades, es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se encara en quauqui endrets. Aguestes darrères son a viatges de mida mejana e de manera isolada de bon desencadenar. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques, tanben ath pè de parets rocassoses e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

En totes es orientacions e tanben per dejós des 2200 m aproximativament: Damb era nhèu recenta, ath long dera jornada son probables purgues de nhèu sense coesion, mès majoritariament petiti. Aguestes pòden desencadenar-se de manera accidentau o naturau. Ath delà, son possibles lauegi d'esguitlament basau.

Es activitats dehòra de pista requerissen experiència e prudència.

Mantell de neu

En ua zòna vasta enquia deluns queirà un shinhau de nhèu. Eth vent moderat transportarà era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn locaument ath dessús de gibra de superfície sustot en pales ombrères emparades deth vent e en còtes mejanes e nautes. Tanben en còtes nautes enes zònes ombrères e emparades deth vent: Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi. Aguestes son favorables ath desencadenament. Es perfius estratigrafics e es tèsti d'estabilitat indiquen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu en aguesti sectors.



Eth deluns serà fòrça soleienc Es plaques de vent aumentarán de mida leugèrament enes pales apròp des crestes orientats a èst e sud. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà sustot enes pales soleienques sustot en còtes baishes e mejanes ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. En còtes mejanes son presenti de 150 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès. Es celhs de nhèu càmbien fòrça en còtes nautes e nauta montanha pera influéncia deth vent.

Tendència

Eth dimars serà soleienc Eth perilh de lauegi de nhèu seca disminuirà progressivament. Eth perilh de lauegi de nhèu umida aumentarà clarament ath long deth dia.