





Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
en dimars, 24 de Març de 2026



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**




Placa de vent



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **petita**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **petita**

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.

Era pòca nhèu recenta e en particular plaques de vent petites isolades se pòden desencadenar damb facilitat de manera naturau o accidentau en totes es orientacions en còtes mejanes e nautes.

Principalement enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades, es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se encara en quauqui endrets. Aguestes darrères son a viatges de mida mejana e de manera isolada de bon desencadenar. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques, tanben ath pè de parets rocassoses e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

En particular enes pales fòrça arribentes soleienques e tanben en còtes baishes: A consequéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles naui purgues de nhèu sense coesion, mès majoritariamente petiti. Aguestes pòden desencadenar-se de manera accidentau o naturau. Ath delà, son possibles lauegi d'esguitlament basau.

Es activitats dehòra de pista requerissen experiéncia e prudéncia.

Mantell de neu

Locaument a compdar d'ager a queigut un shinhau de nhèu. Eth vent moderat a transportat era nhèu recenta e era nhèu vielha. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen locaument ath dessús de gibra de superfícia sustot en pales ombrères emparades deth vent e en còtes mejanes e nautes. Tanben en còtes nautes enes zònes ombrères e emparades deth vent: Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi. Aguestes son favorables ath desencadenament. Es perfius estratigrafics e es tèsti d'estabilitat indiquen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu en aguesti sectors.

Eth deluns serà fòrça soleienc Ath long dera jornada era radiacion solara causarà sustot enes pales



soleienques ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu.

En còtes mejanes son presenti de 150 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès. Es celhs de nhèu càmbien fòrça en còtes nautes e nauta montanha pera influéncia deth vent.

Tendència

Eth dimars serà soleienc Eth perill de lauegi de nhèu seca disminuirà progressivament. Eth perill de lauegi de nhèu umida augmentarà clarament ath long deth dia.