




## Grad de perih 1 - Fèble



### Purgues de nhèu umida en cors dera jornada.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perih de purgues de nhèu umida augmentarà progressivament. Ath delà, son possibles beri lauegi d'esguitlament basau. Es lauegi son en generau de mida petita. Es endrets perilhosi se tròben en pales fòrça arribentes erboses e tanben en terren dret e escarpat.

En limit sud d'Aran: Acumulacions de nhèu ventada mès recentes se pòden, de manèra isolada, desencadenar en pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament. Es lauegi son sonque de mida petita mès de bon desencadenar. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques.

### Celh de nhèu

Eth heiredament nocturn serà fòrça bon.

Enes pales ombrères: Eth mantèth de nhèu ei ben consolidat, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta de regèu grossuda portanta.

Per dessus des 2000 m aproximativament son presenti de 50 a 60 cm de nhèu. En còtes baishes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn. Ath long dera jornada: A causa dera crosta de gèu i a eth perih d'esguitlar e quèir.

### Tendència

Dijaus: A conseqüència der augment dera temperatura diürna, escàs augment deth perih de purgues de nhèu umida.