





Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant
en dimèrcles, 31 de Deseme de 2025



Placa de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**




Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Lliscament de neu



2200m

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion. Possibles lauegi d'esguitlament basau.

Es plaques de vent deth dimenge an d'èster avalorades damb prudència especiaument en pales fòrça arribentes orientades ath nòrd e oèst. Aguestes son a viatges grossudes e en quauqui casi favorables ath desencadenament. Enes limits sud e èst d'Aran, En còtes nautes, apròp de còths e crestes: En cors dera jornada sustot enes pales orientadi a èst, sud e oèst se formaràn plaques de vent de mida petita.

Especiaument enes pales ombrères pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'ua persona.

A conseqüència dera radiacion solara, ath long dera jornada son possibles naui lauegi d'esguitlament basau, tanben de mida mejana.

En particular enes limits sud e èst d'Aran, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perilh ei mès gran. Es excursions damb esquís e raquetes de nhèu, e tanben es baishades dehòra de pistes requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e cautela.

Mantell de neu

Enes pales arribentes soleienques: Damb es temperatures doces e era radiacion solara, eth mantèth de nhèu s'a fixat. Enes pales emparades deth vent ombrères: De cap ara superfícia, era nhèu s'a facetat, damb gibra de superfícia.

Enes pales ombrères en còtes mejanes e nautes: Eth ligam des plaques de vent ei desfavorable. Es tèsti d'estabilitat confirmen aguesta situacion.



Dimars: Enes limits sud e èst d'Aran En còtes nautes, apròp de còths e crestes: Eth vent deth nòrd transportarà era nhèu vielha.

En còtes mejanes son presenti de 50 a 100 cm de nhèu, locaument encara mès. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.