



# Butlletí Perill Allaus

Emès el 10/2/2015 a les 8:00 Vàlid pel 10/2/15 i 11/2/2015



**Perill 24h.**



**MARCAT**

**Situació:**

**NEU VELLA**

**Perill 48h.**



**MARCAT**

**Tendència 72h.**



Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

La estabilització de les noves plaques a les solanes ha estat ràpida, i poc a poc la situació de les solanes i de les obagues es va diferenciant. Mentre a les solanes hi trobem neu en un cicle diari de fusió-regel i hi esperem petites allaus de neu humida, a on no toca el sol la neu és freda i pols, i el problema encara són les profundes plaques sobre nivells de neu sucre, potencialment sensibles a la sobrecàrrega d'una persona i que podrien donar lloc a allaus difícils de sobreviure en terreny específic.

## Neu vella


**Orientació**




**Cota**



**Mida**



**Probabilitat**




La neu caiguda al darrer episodi va guanyant cohesió i a les obagues es situa sobre nivells sucre que comencen a ser actius. En terreny de més de 35 graus, convex i sense suports, podríem provocar allaus de mida suficient per enterrar tot un grup, que implicarien tota la neu caiguda en el darrer episodi.

Els problemes de neu vella no mostren cap indicatiu de la seva presència a la superfície de la neu. L'única manera de gestionar-los és ser prudent en l'elecció del terreny en les cotes i orientacions indicades. Tingueu en compte la mida de les allaus previstes quan escolliu els llocs on reagrupar-vos.

## Lliscaments i neu humida


**Orientació**



**Cota**



**Mida**



**Probabilitat**



Les temperatures altes i l'insolació que s'esperen faran augmentar l'activitat natural de lliscaments especialment en solanes (tot i que en poden caure a la resta d'orientacions), i també les allaus de neu humida de sortida puntual en vessants molt drets i prop d'afloraments rocosos.

Tingueu en compte que els lliscaments poden implicar força neu d'elevada densitat i resultar força perillosos. Romandre a partir de migdia en vessants poc rugosos de forta inclinació és poc recomanable.

## Estat de la neu

La neu encara arriba a fons de vall. A uns 2200 m els gruixos superen clarament els 150cm. A cotes altes i especialment al límit S, l'efecte del vent és força evident i s'alternen llocs amb grans acumulacions i altres força erosionats. Mentre les solanes per sota dels 2000 m ja estan afectades per processos de fusió/regel, la neu de les obagues encara està molt freda, seca i fonda allà on no hi ha tocat el vent. A la base de la nevada hi ha nivells sucre febles en la majoria d'orientacions, més gruixudes a les obagues, que encara es presenten actives.

## Previsió meteorològica

Aquests dies regna un potent anticicló situat sobre les illes britàniques. Les properes 48 hores espren cels ben serens, vents fluixos del sud i temperatures sense grans canvis respecte ahir.

**Predictor:**

Ivan Moner

**Patrocinen:**



