

Butlletí Perill d'Allaus


Emès el 12/02/2017 a les 08:00
Vàlid pel 12 i 13/02/2017



Perill 24h.



Distribució



Situació




Perill 48h.




Amb el vent d'est i sud, s'han format i continuaran formant-se noves plaques fràgils i fàcils de desencadenar en els sotavents favorables d'orientacions oest i nord principalment. En vessants obacs i terreny molt específic, les capes febles persistents es mantenen despertes a l'interior del mantell, amb capacitat d'activar-se i generar allaus de placa amb amples cicatrius.

Neu ventada


Orientació



Cota



Mida




Probabilitat




Amb el vent de l'est i sud que bufa fort des d'ahir la tarda, i la nevada feble però que ja ha acumulat 10-15 cm nous sobretot al límit est i sud de la vall, estan causant transport rellevant i formació de noves plaques de vent. Al ser tant recents, són molt fràgils i fàcils de desencadenar, amb potencial per arrossegar-nos i per demà matí en alguns indrets les noves plaques ja podrien enterrar-nos. El transport serà perceptible i els indrets amb noves acumulacions seran evidents. Vigilem possibles esquerdes, profunditat de traça variable i també en canvis d'orientació on les condicions poden variar de manera sobtada.

Capas febles persistents


Orientació



Cota



Mida



Probabilitat




Tot i trobar-se cada cop més profundes per les successives nevades, en determinats vessants obacs, alts i oberts, la capa de neu sucre encara és prou superficial i mostra capacitat d'activació i propagació. Sovint per mitjà de desencadenaments remots, i amb potencial per causar allaus de placa amb amples cicatrius.

No és un escenari habitual en les nostres muntanyes: la probabilitat de desencadenament és relativament baixa però les conseqüències serien elevades. La millor manera per tractar-ne el risc és fer decisions conservadores de terreny.

Estat de la neu

La neu és present des del fons de vall amb gruix suficient per lliscar en vessants obacs. Les estacions a 2200 m registren de 135 a 165 cm, en la mitjana per l'època. Amb l'entrada de vent de sud, la neu freda i lleugera en superfície s'està redistribuint progressivament formant noves plaques fràgils. A les obagues persisteix la capa de neu sucre sense cohesió prop de la base del mantell, que en indrets on no es troba massa profunda encara es mostra activa i amb capacitat de produir allaus de placa de propagacions sorprenents.



Meteo

Els propers dos dies estarem a sotavent de la borrasca instal·lada a l'oest de la Península. Durant el dia cel variable, més tapat prop dels límits est i sud, i amb més clarianes cap al nord. Temperatures encara en lleu augment i poc contrast tèrmic diari, amb la iso0 situant-se a 2000 m. Vent fort del sud-est i sud per damunt del límit del bosc. La matinada de diumenge tornarà a precipitar, 10-15 cm més amb cota a 1700 m i pluja a cotes baixes.



Predictor: Montse Bacardit

