


Perill 24h.



MODERAT

Distribució



Situació



Perill 48h.



MODERAT


Pocs canvis en la estabilitat de la neu respecte als darreres dies. Hem de seguir atents a les obagues obertes amb mantell prim que és on les capes de neu sucre enterrades podrien donar lloc a allaus grans i destructives. La probabilitat és molt baixa però les conseqüències poden ser molt greus. El que sí que ens trobarem amb seguretat són purgues que provocarem de neu pols reciclada en obagues molt dretes.

Capas febles persistents


Orientació



Cota



Mida



Probabilitat




La capa de neu sucre enterrat el 10 de gener encara dona resultats positius als tests d'estabilitat en obagues amb mantell prim, però fa més d'una setmana que no tenim notícies de cap accident lligat a aquest nivell. Això no ens ha de fer baixar la guàrdia ja que com el seu nom indica, és un problema que persisteix en el temps i sembla que encara l'arrossegarem força dies. Cal evitar aquest terreny obac, alt i obert on hi hagi pocs ancoratges i el mantell sigui prim. És un terreny molt singular però en cas de desencadenar una placa, aquesta pot tenir grans dimensions. En aquestes mateixes cotes i orientacions, en terreny molt dret és fàcil desencadenar purgues de neu pols reciclada que es posa ràpidament en moviment i pot fer-nos caure amb facilitat.

Lliscaments

Orientació



Cota



Mida



Probabilitat



Continuarà l'activitat de caigudes de plaques de fons en vessants habituals a partir de migdia, encara que cada cop estan més purgades. També, i coincidint amb màxim de les temperatures, poden moure's lliscaments en vessants est menys habituals.

Estat de la neu

La neu és present des del fons de vall i n'hi ha suficient per lliscar des dels 1300 m en vessants obacs i 1600 m a les solanes. Els gruixos a 2200 m ronden els 150 cm, una mica per sota la mitjana per l'època de l'any. La qualitat de la neu és molt variable en cotes i orientacions. A les solanes la trobem primavera, amb cicles diaris de fusió-regel. A les obagues podem trobar alternances de neu pols, neu ventada i crostes superficials que es trenquen amb els esquís.

A la part basal del mantell dels vessants obacs es manté la capa de neu sucre (gobelets) molt desenvolupada i a una profunditat variable que encara és reactiva als tests quan està a menys d'un metre de la superfície i que és l'origen del principal problema de perill.

Meteo

L'anticicló atlàntic s'enretira cap a l'oest i es forma una baixa al sud de la Península. Tot plegat portarà pocs canvis. El cel avui continuarà com ahir amb núvols alts i les temperatures tocaran sostre amb iso 0 als 3200 m. Demà el dia serà semblant, amb la temperatura una mica més baixa i vent bufant fluix del sud-oest i oest.

24h.



48h.

